

VOS IMAGES



Ulcération chronique du membre inférieur

Cet homme de 65 ans était adressé pour une greffe de peau mince sur un ulcère malléolaire interne de la cheville évoluant depuis 15 ans ; ses principaux antécédents étaient une hypertension artérielle, et trois infarctus du myocarde. Des soins locaux avaient été jusque-là préconisés, sans grande efficacité. L'examen clinique montrait une vaste ulcération de 10 cm de grand axe, à bordures finement télengiectasiques, sans stigmates d'insuffisance veineuse chronique (*v. figure*). Une biopsie cutanée était réalisée, l'examen anatomopathologique était en faveur d'un carcinome basocellulaire. Le malade était alors traité par vismodégib, avec une réduction du volume tumoral à 3 mois. Le traitement est actuellement poursuivi afin d'avoir une faible taille tumorale permettant l'exérèse chirurgicale.

AUORE LE GUERN,
OLIVIER CANNESON,
DELPHINE
DEREGNAUCOURT,
ANNIE VERMERSCH-
LANGLIN

Service de
dermatologie
et vénéréologie,
centre hospitalier
de Valenciennes,
Valenciennes,
France.

aurora.leguern
@gmail.com

La pérennisation des plaies des membres inférieurs peut être liée à de nombreux facteurs : dénutrition, insuffisance veineuse, diabète, lymphoedème, artériopathie, vascularites, tumeurs malignes. Une étude¹ a montré que pour toute lésion ne s'améliorant pas sous soins locaux optimaux, 5 critères suspects de malignité devaient être recherchés : tableau atypique, petite taille (< 3 cm²), durée d'évolution ≥ 24 semaines, tissu de granulation ≥ 75 % de la surface

de l'ulcère, tissu de granulation rose pâle. Elle montrait un taux élevé de carcinomes, principalement basocellulaires, lors de la biopsie systématique de ces plaies chroniques. Une ulcération des membres inférieurs atypique ou d'évolution défavorable malgré des soins locaux bien conduits, doit donc être biopsiée, pour éliminer une transformation maligne en carcinome épidermoïde et exclure les diagnostics différentiels dont le carcinome basocellulaire.

RÉFÉRENCE

1. Gil T, Pistunovich Y, Kulikovskiy M, et al. A prospective case-control study of non-healing wounds of the lower limbs - the value of biopsies for ulcerating carcinoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29:337-45.

A. Le Guern, O. Cannesson et D. Deregnaucourt déclarent n'avoir aucun lien d'intérêts.

A. Vermersch-Langlin déclare des interventions ponctuelles pour Pfizer et avoir été prise en charge à l'occasion de déplacements pour congrès par Pfizer, Janssen et AbbVie.